



เรื่อง กระพี้เขาควาย



รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cultrate Grah. Ex Banth.

ชื่อวงศ์ PAPILIONACEAE

ชื่อสามัญ Burma Blackwood

ชื่ออื่นๆ กระพี้ เกร็ดเขาควาย เกิดดำ กำพี้ จักจัน อีเม็งไบมน

ลักษณะทั่วไป

ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบสูง 15 - 25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมยาว ค่อนข้างโปร่ง เปลือกสีเทานวลๆ เปลือกในสีน้ำตาลแดง กระพี้สีน้ำตาลอ่อน กิ่งอ่อนยอดอ่อนมีขน

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ยาว 10 - 15 ซม. มีใบย่อย รูปขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 2 - 2.5 ซม. ยาว 6 - 7.5 ซม. ส่วนกว้างที่สุดค่อนข้างไปทางปลายใบมนโค้งหักเว้าเห็น ได้ชัด โคนฐานใบสอบเข้าเป็นรูปลิ้มหรือมนกลม เนื้อใบค่อนข้างหนา ใบแก่เกลี้ยง

ดอก ออกเป็นช่อ มีลักษณะเป็นกระจุกคล้ายรังผึ้งสีขาวอมชมพูอ่อนๆ ออกที่กิ่งข้างตาและปลายยอด ฐาน



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กลีบดอกเชื่อมติดกันรูปถ้วยกลีบดอกบานแล้วขอบกลีบดอกม้วนขึ้น มีลักษณะคล้ายปากนก

ผล เป็นฝักแบนขอบขนานปลาย และโคนบนกว้าง 2 ซม. ยาว 5 – 10 ซม. โค้งงอเล็กน้อย แต่ละฝักมี 1 – 3 เมล็ด ฝักแก่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

นิเวศวิทยา ขึ้นตามป่าเบญจพรรณโปร่งทั่วไป สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,000 ม. ทางภาคเหนือมีอยู่ ปลาย ขึ้นปะปนกับไม้สักบ้าง ในป่าแดงก็มี ออกดอก มีนาคม – เมษายน

ขยายพันธุ์ โดยการใช้เมล็ด

ประโยชน์ ด้านสมุนไพร เนื้อไม้แก้พิษไข้ ถอนพิษสำแดง แก้พิษไข้กลับซ้ำแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำ

ภาพโดย : <http://treeofthai.com/wp-content/uploads/2015/02/กระพี้เขาควาง-4.jpg>

คำสำคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย์ ประเทศ และคนอื่นๆ. (2543). การสำรวจพรรณไม้ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=66&code_db=610010&code_type=01