

เรื่อง กระจับนก



รายละเอียด

ชื่ออื่น ๆ : กระจับนก, ตานขี้ม้า, มะหากาหลัง(เหนื่อ), นางใย, อึ่งเปาะ(อุบลราชธานี), มะตะ, คอแห้ง, มะหากา
หนัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Euonymus cochinchinensis* Pierre.

ชื่อวงศ์ : CELASTRACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ต้นกระจับนกเป็นไม้ต้น สูง 6-10 เมตร

ใบกระจับนกเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ กว้างประมาณ 5-7 เซนติเมตร ยาว 1.6-4.5 เซนติเมตร รูปรี
แกมขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง เส้นใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 3-8 มิลลิเม
ตร

ดอกกระจับนกสีเหลืองถึงชมพูแดง ออกเป็นช่อตามซอกใบ แกนช่อยาว 3-10.5 เซนติเมตร ดอกกว้าง
1-2 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 3-5 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ ขอบจักเป็นฝอย ส่วนฐานแผ่เป็นจานกลมมน
ขนาด 3 มิลลิเมตร ก้านเกสรผู้ยาว 2 มิลลิเมตร จำนวน 5 อัน

ผลกระจับนกรูปทรงป้อม ปลายเว้าเป็น 5 พู แต่ละพูขนาด 1 เซนติเมตร ตอนบนเว้าเป็นแอ่ง เมล็ดรูปรี

ปลายมนทั้งสองด้าน ยาว 5-6 มิลลิเมตร

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เปลือก, ราก

สรรพคุณ กระจับบก :

เปลือกนำเอามาต้มหรือแช่ในสุรา ใช้ดื่มกินก่อนอาหารจะทำให้ย่อยอาหาร รับประทานอาหารได้มาก

รากนำมาแช่น้ำ หรือฝนน้ำ รับประทาน แก้อาการผิวดำแดง (รับประทานอาหารแสลงไข ทำให้โรคกำเริบ อาจมีอาการท้องเสีย) แก้อาการเมาเห็ด

คำสำคัญ : กระจับบก

ที่มา : <https://www.samunpri.com>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2020-05-12

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1537&code_db=610010&code_type=01