

## เรื่อง เอื้องผึ้ง



## รายละเอียด



ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium lindleyi Steud.

ชื่อพ้อง Dendrobium aggregatum Roxb.

ตระกูล ORCHIDACEAE

ลักษณะทั่วไป

**ต้น** ลำลูกกล้วยสั้น ป้อมสั้น ประมาณ 6 - 8 ซม. อาจยาวได้ถึง 10 ซม.

**ใบ** รูปรี แผ่นใบแข็งหนาเหนียว สีเขียวเข้ม หนา สาก ยาวประมาณ 5-10 ซม. มีใบเพียง 1 ใบ/ลำลูกกล้วย บริเวณปลายลำ

**ดอก** ช่อดอกเป็นช่อห้อย ก้านดอกพอม จำนวนดอก 15 ดอก/ช่อ ดอกขนาด 3 ซม. กลีบดอกและปากมีสีเหลือง ซึ่งความเข้มของสีดอกมีความผันแปรอยู่มาก ตั้งแต่สีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลืองเข้ม ดอกมีอายุการบาน 1 สัปดาห์

**ราก** เป็นแบบรากกึ่งอากาศ (Semi-epiphytic)

**ฤดูกาลออกดอก** มีค -เมย

**การขยายพันธุ์** แยกต้น เพาะเมล็ด

**การดูแลรักษา** ชอบขึ้นอยู่บนต้นไม้ที่มีการผลัดใบ ทำให้ได้รับแสงแดดในช่วงฤดูหนาว



การใช้ประโยชน์ ไม่ประดับ

ถิ่นกำเนิด พบในอินเดีย พม่า ไทย และจีนตอนใต้

แหล่งที่พบ พบตามป่าดิบแล้ง เกือบทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง

แหล่งที่มา <http://oknation.nationtv.tv/blog/thairat/2012/12/17/entry-2>

คำสำคัญ : กล้วยไม้ เอื้อง เอื้องผึ้ง

ที่มา : 23 หมู่ 6

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวปิยธิดา ก้อนจำปา

วันที่ : 2017-02-25

[https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page\\_id=345&code\\_db=DB0013&code\\_type=F003](https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=345&code_db=DB0013&code_type=F003)