

เรื่อง จิว

รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba Linn.

ชื่อวงศ์ BOMBACACEAE

ชื่อสามัญ Cotton Tree, Kapok Tree, Red cotton Tree, Silk cotton Tree

ชื่ออื่น ๆ จิวบ้าน (ทั่วไป) จิวแดง (กาญจนบุรี) จิวปงแดง (จันทบุรี)

ลักษณะทั่วไป

ต้น ไม้ต้น ผลัดใบ ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม กิ่งแผ่ ออกตั้งฉากกับลำต้น

ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกสลับ ใบย่อย 5-7 ใบ รูปไข่หรือรูปรีปลายเรียวแหลมโคนสอบแคบ

ดอก สีแดง ตามปลาย ๆ กิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 3-4 แฉก ไม่เท่ากัน ด้านนอกมีขน มันเป้นนงากกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบม้วนออก เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 เซนติเมตร เกสรตัวผู้ จำนวนมากโคนก้าน เกสรติดกันเป็นกลุ่ม ๆ

ผล รูปรี หรือรูปขอบขนาน คล้ายผลนุ่น เมล็ดสีดำ หุ้มด้วยปุยสีขาว

นิเวศวิทยา ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ

ออกดอก มกราคม – กุมภาพันธ์ ทั้งใบก่อนออกดอก

การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด

ประโยชน์ด้านสมุนไพร รากเป็นยาทำให้อาเจียน เปลือก ทำเชือก ยางแก้ท้องร่วง ใบตำเป็นผงทาแก้ฟกช้ำ ดอกแห้ง ทำยาทาระงับปวด แก้พิษไข้

ภาพโดย : <http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/53726828.jpg>

คำสำคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย์ ประเทศ และคนอื่น ๆ. (2543). การสำรวจพรรณไม้ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=77&code_db=610010&code_type=01